
Study
RR (95% CI)
% Weight
High risk
Nemoto(2001) 0.67 (0.52, 0.85) 16.70
Suzuki(2002) 0.33 (0.16, 0.69) 5.24
Subtotal (I-squared = 73.0%, p = 0.054) 0.51 (0.25, 1.05) 21.94
.
Intermediate risk
Nakamura(2005) 0.49 (0.19, 1.27) 3.37
Cruz(2009) 0.61 (0.34, 1.09) 7.16
Maynar(2013) 0.50 (0.13, 1.87) 1.91
Saito(2015) 1.04 (0.77, 1.39) 14.80
Iwagami(2016) 0.86 (0.78, 0.95) 21.69
Subtotal (I-squared = 17.2%, p = 0.305) 0.85 (0.73, 1.00) 48.94
.
Low risk
Vincent(2005) 1.06 (0.37, 3.02) 2.88
Iwagami(2014) 1.05 (0.82, 1.36) 16.33
Takahashi(2014) 0.22 (0.01, 4.02) 0.43
Payen(2015) 1.42 (0.89, 2.29) 9.48
Subtotal (I-squared = 0.0%, p = 0.489) 1.11 (0.89, 1.39) 29.12
.
Overall (I-squared = 57.4%, p = 0.009) 0.83 (0.68, 1.00) 100.00
NOTE: Weights are from random effects analysis
.1
.5
1
2
5
10
Favour PMX-HP
Favour Conventional