

פִוְמִזּוֹדִיטִיסָרָאשׁוֹנִית

ד"ר יעקב ביקלס*, ד"ר ליאת בן-סירה**, ד"ר עדה קסלר**, פרופ' שלמה וינטרוב*

המחלקה לאורתופדיית ילדים*, מחלקה לרדיולוגיה** ביה"ח לילדים דנה, מרכז רפואי תל-אביב,
הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב, ישראל

פִוְמִזּוֹדִיטִיסָרָאשׁוֹנִית הינה תהליכי זיהומי של שריר בלבד אשר אינם תוצאה זיהום סמור
בעצם או רקמות רכות. ההסתמנות הקלינית האופיינית הינה מחלת חום מת-חריפה
והתהווות מורסה תוך-שרירית בשරירי הגפיים התחתונות וחגורת האגן. פִוְמִזּוֹדִיטִיסָרָאשׁוֹנִית
מדוחחת לעיתים קרובות באפריקה ובסביב דרום האוקיינוס השקט ולעתים נדירות בארץ-
הברית ובאזור אקלים ממוזג. נדירותה של המחלת והסתמנותה הקלינית המורפלת
מבאים לידי כך שלעיתים קרובות נגרם עיכוב באבחנה ובבדיקות אחרות, שכיחות יותר,
نبזקיות קודם לכך. בעוד שבחינה מוקדמת וטיפול נאות מבאים לריפוי מלא ברוב המקרים
של המטופלים, אייחור באבחנה עלול לגרום לסיבוכים קשים ואף למותו של המטופל.
הדווחים על פִוְמִזּוֹדִיטִיסָרָאשׁוֹנִית מקשים על בניית תובנה מkapf' לגבי המחלת ואופן
الطיפול بها כיוון שרובם תיאורי מקרה או סדרות מטופלים קטנות. המאמר שלහן סקר
ומנתח את נתוניים הקליניים של 676 חולים עם פִוְמִזּוֹדִיטִיסָרָאשׁוֹנִית עליהם דוח בספרות
הרפואית האנגלית מראשית שנות ה-60 ועד היום. הסקירה מתמקדת באפידמיולוגיה,
פטופיזיולוגיה, ההסתמנות הקלינית וההנחיות לטיפול.