

Italian translated abstract of the following abstract: PREDISPOSING FACTORS FOR RECURRENT SHOULDER DISLOCATION AFTER ARTHROSCOPIC TREATMENT

Title: Fattori di rischio per la recidiva di instabilità dopo trattamento artroscopico

Abstract

Introduzione:

Il trattamento artroscopico dell'instabilità anteriore di spalla è ancora lontano dall'assenza di recidive. Abbiamo ipotizzato che i pazienti con il più alto rischio di recidiva dopo un trattamento artroscopico siano riconoscibili pre-operatoriamente sulla base della storia clinica. L'obiettivo del presente studio è stato di identificare i fattori di rischio per recidiva di instabilità in una popolazione di base di pazienti trattati artroscopicamente per instabilità traumatica anteriore unidirezionale.

Metodi:

Dal Gennaio 2000 a Dicembre 2003, abbiamo trattato artroscopicamente, con tecnica di Bankart, 625 pazienti con instabilità traumatica unidirezionale. 385 pazienti sono stati inclusi nello studio. Sono stati raccolti i dati demografici e le visite di controllo sono state effettuate a tre, sei, dodici, ventiquattro e trentasei mesi.

Risultati:

Al controllo finale a trentasei mesi dall'intervento, trentuno pazienti (8.1%) avevano avuto una recidiva di instabilità; la percentuale era del 13.3% tra i pazienti più giovani di 22 anni e del 6.3% tra i pazienti più anziani. I fattori di rischio risultati statisticamente rilevanti per la recidiva di instabilità sono stati: l'età al tempo della prima lussazione, il sesso maschile e il tempo trascorso dal primo episodio di instabilità alla chirurgia.

Conclusioni:

É possibile identificare prima dell'operazione i pazienti che avranno una percentuale maggiore di recidiva di instabilità di spalla basandosi sul sesso, l'età e il tempo trascorso dalla prima lussazione alla chirurgia.

Livello di evidenza:

Livello Prognostico II