

“亞洲双眼手術的技術，原則和基準”。

背景：

Asian Blepharoplasty是一個看似簡單的程序，其目標是為了給單眼皮的亞洲人創造出擁有双眼皮的機會。因此在過去的120年裡，有許多獨特開双眼方法的倡導者。作者對過去12年中進行的362件双眼皮手術進行了自我分析。

方法：

符合納入標準的362個案例以電子表格數據格式列表。根據每位手術者的病例記錄的年齡，性別，服務日期和隨訪情況，無論手術是用於初次還是修復目的。記錄的是術前之双眼線狀態，無論是沒有摺痕（零毫米）還是具有基本的低摺痕或高摺痕高度。手術者選擇的摺痕高度和形式。手術時注意到是否觀察到腱膜前的脂肪，然後採取部分切除或再沉積的術中觀察。偶然需要修改的情況亦被記錄在內。

結果：

362名患者（724個上瞼）：

初次上瞼成形術佔81%（295），修改上瞼成形術佔19%（67）。

性別分佈為女性87%（315），男性13%（47）。

年齡分佈範圍為12至75歲。

選擇的摺痕高度範圍為6.0毫米至8.0毫米，最多選的為7.0毫米。

在所選擇的摺痕形式中，平行形式為65% (236), 內向摺痕形式為35% (126)。

結論

採用 preaponeurotic platform 的梯形減壓術進行双眼皮手術已被證明是在這位醫師手中有用的技術。它是一種安全，有效且基於解剖學的技術，不涉及使用埋藏永久性縫合線。本文討論了五個必要因素（為上瞼肌腱膜附合，細緻清除前腱膜間隙過量的脂肪及眼輪匝肌，精確定探出雙眼形成位點，檢測潛在或輕微的上瞼下垂，及避免用能夠引致Faden 相似影響的埋線法) 和作者的基準，以便取得更好的成功率。這篇論文介紹了應用於初次和修改双眼皮成形術，應用策略和潛在缺陷的結果。