Variables	Univariate model		Multivariate model	
	Hazard ratio (95% CI)	*P* value	Hazard ratio (95% CI)	*P* value
Subgroup of participants with impaired fasting glucose (*n* = 491)				
NAFLD-free nondrinkers	Reference		Reference	
NAFLD-free light drinkers	0.089 (0.012—0.638)	0.016	0.076 (0.010—0.546)	0.011
NAFLD-free moderate drinkers	0.561 (0.280—1.124)	0.103	0.576 (0.284—1.168)	0.126
NAFLD nondrinkers	2.102 (1.497—2.950)	<0.001	1.798 (1.239—2.608)	0.002
NAFLD light drinkers	4.264 (2.535—7.056)	<0.001	3.087 (1.787—5.332)	<0.001
NAFLD moderate drinkers	4.247 (3.050—5.915)	<0.001	2.459 (1.670—3.619)	<0.001
Current smoking	2.470 (1.910—3.196)	<0.001	2.344 (1.711—3.212)	<0.001
Age	1.028 (1.019—1.038)	<0.001	1.040 (1.029—1.052)	<0.001
Body mass index ≥ 23 kg/m^2	2.399 (1.660—3.467)	<0.001	1.425 (0.949—2.139)	0.088
Waist circumference ≥ 90 cm	2.408 (1.864—3.111)	<0.001	1.246 (0.927—1.673)	0.144
Triglyceride ≥ 150 mg/dL	1.752 (1.357—2.261)	<0.001	1.228 (0.920—1.639)	0.164
SBP ≥ 130 mmHg, DBP ≥ 85 mmHg	1.205 (0.908—1.598)	0.197	0.849 (0.634—1.138)	0.273
HDL-cholesterol < 40 mg/dL	1.950 (1.297—2.931)	0.001	1.275 (0.840—1.937)	0.254
Serum uric acid > 7.00 mg/dL	1.510 (1.139—2.001)	0.004	1.143 (0.843—1.549)	0.390