Variables	Univariate model		Multivariate model	
	Hazard ratio (95% CI)	*P* value	Hazard ratio (95% CI)	*P* value
Subgroup				
NAFLD-free nondrinkers	Reference		Reference	
NAFLD-free light drinkers	0.368 (0.162—0.839)	0.017	0.362 (0.159—0.825)	0.002
NAFLD-free moderate drinkers	0.784 (0.421—1.460)	0.443	0.564 (0.302—1.055)	0.007
NAFLD nondrinkers	4.070 (3.169—5.228)	< 0.001	2.561 (1.913—3.429)	< 0.001
NAFLD light drinkers	7.227 (5.244—9.958)	< 0.001	4.305 (2.999—6.180)	< 0.001
NAFLD moderate drinkers	13.714 (10.616—17.717)	< 0.001	4.228 (3.104—5.761)	< 0.001
Current smoking	4.096 (3.405—4.929)	< 0.001	2.967 (2.415—3.646)	< 0.001
Age	1.048 (1.041—1.054)	< 0.001	1.048 (1.041—1.056)	< 0.001
Body mass index ≥ 23 kg/m²	4.521 (3.550—5.758)	< 0.001	1.526 (1.191—1.955)	< 0.001
Waist circumference ≥ 90 cm	3.923 (3.274—4.701)	< 0.001	0.997 (0.806—1.234)	0.981
Triglyceride ≥ 150 mg/dL	2.564 (2.139—3.074)	< 0.001	1.218 (0.995—1.491)	0.056
SBP ≥ 130 mmHg, DBP ≥ 85 mmHg	2.587 (2.133—3.138)	< 0.001	1.054 (0.859—1.293)	0.613
HDL-cholesterol < 40 mg/dL	1.697 (1.310—2.197)	< 0.001	1.303 (1.001—1.697)	0.049
Fasting plasma glucose ≥ 100 mg/dL	11.868 (9.857—14.289)	< 0.001	6.818 (5.577—8.336)	< 0.001
Serum uric acid > 7.00 mg/dL	1.797 (1.478—2.184)	< 0.001	1.010 (0.820—1.242)	0.928